

Fütterungsempfehlungen für die Mast von Nachkommen aus PIC-Hybridsau (Camborough/Camborough 25/Camborough 29) x PIC-Eber Vigor³⁸⁰ **DREIPHASIGE Mast**

ZIEL (für die gemischtgeschlechtliche Gruppe):
 Muskelfleischanteil: 55,25 % - Tageszunahmen: 910 g - Futtermverwertung: 1 : 2,75

SAUEN

Mast woche	Lebendgewicht, kg	Tageszunahmen, g	Energieaufnahme, MJ ME	Futtermenge, kg 13,4 MJ ME 1,1 % Lysin	Futtermenge, kg 13,0 MJ ME 1,0 % Lysin	Futtermenge, kg 12,6 MJ ME 0,9 % Lysin
1	27,0 - 32,8	828	20,77	1,55		
2	32,8 - 39,0	885	22,78	1,70		
3	39,0 - 45,3	900	25,46	1,90		
4	45,3 - 51,7	914	28,14	2,10		
5	51,7 - 58,2	929	30,15	2,25		
6	58,2 - 64,8	942	31,20		2,40	
7	64,8 - 71,5	957	32,50		2,50	
8	71,5 - 78,2	957	33,80		2,60	
9	78,2 - 84,8	942	35,10		2,70	
10	84,8 - 91,4	942	36,40		2,80	
11	91,4 - 98,0	942	36,54			2,90
12	98,0 - 104,5	929	37,80			3,00
13	104,5 - 111,0	929	37,80			3,00
14	111,0 - 116,4	914	37,80			3,00

BÖRGE

Mast woche	Lebendgewicht, kg	Tageszunahmen, g	Energieaufnahme, MJ ME	Futtermenge, kg 13,4 MJ ME 1,1 % Lysin	Futtermenge, kg 13,0 MJ ME 1,0 % Lysin	Futtermenge, kg 12,6 MJ ME 0,9 % Lysin
1	27,0 - 32,8	828	20,77	1,55		
2	32,8 - 39,0	885	24,12	1,80		
3	39,0 - 45,3	900	27,47	2,05		
4	45,3 - 51,8	929	29,48	2,20		
5	51,8 - 58,4	942	31,49	2,35		
6	58,4 - 65,1	957	32,50		2,50	
7	65,1 - 71,8	957	33,80		2,60	
8	71,8 - 78,4	942	35,10		2,70	
9	78,4 - 85,0	942	36,40		2,80	
10	85,0 - 91,5	929	37,70		2,90	
11	91,5 - 97,9	914	37,80			3,00
12	97,9 - 104,1	885	39,06			3,10
13	104,1 - 110,1	857	39,06			3,10
14	110,1 - 115,9	828	39,06			3,10

Stand: Januar 2009